

**FRAGEBOGEN ZUR ERLANGUNG VON 2 KREDITS FÜR DIE ROUNDTABLE Gynäkologie
VOM 27.11.25**

1. Welche Erreger sind bei einer Vulvovaginitis im vorpubertären Alter typisch? (Mehrfachantwort möglich)
 - a. *Hämophilus influenzae*
 - b. *Candida albicans*
 - c. *Chlamydia trachomatis*
 - d. *Gardnerella vaginalis*
 - e. Streptokokken A

2. Welche Aussagen bezüglich Lichen sclerosus sind richtig? (Mehrfachantwort möglich)
 - a. Das typische Manifestationsalter im Kindes-/Jugendalter ist zwischen 4 und 7 Jahren
 - b. Veränderungen der Architektur/Vernarbungen treten im Kindesalter nicht auf
 - c. Kinder brauchen keine Erhaltungstherapie
 - d. Regelmässige Kontrolle bis mind. Eintritt der Pubertät sind empfohlen
 - e. Der Lichen sclerosus verschwindet in der Pubertät

3. Welches ist die häufigste Ursache einer AUB (abnorme uterine Blutung) bei Jugendlichen?
 - a. Infektion
 - b. Ovariell (Anovulation)
 - c. Gerinnungsstörung

4. Sie erhalten in Ihrer Praxis eine 7-jährige Patientin, die seit gestern über eine geringe vaginalen Blutung klagt, zum zweiten Mal mit einem Abstand von etwa einem Monat zwischen den beiden Episoden. Anamnese und Status sind unauffällig. Was machen Sie?
 - a. Sie vermuten eine frühe Menarche und schlagen vor, sie in einigen Wochen erneut zu sehen.
 - b. Sie bitten den Kinderschutzservice in Ihrer Region um eine Bewertung.
 - c. Sie veranlassen eine Blutuntersuchung und eine Ultraschalluntersuchung des Beckens und fordern eine Facharztbeurteilung an.

Bitte die Richtige Antworten an info@medicaltv.ch per email mit Ihrem Namen senden.

Danke

QUESTIONNAIRE POUR OBTENIR LES 2 CRÉDITS POUR LA TABLE RONDE DE GYNÉCOLOGIE DU 27.11.2025.

1. Quels sont les agents pathogènes typiques d'une vulvovaginite chez les enfants prépubères ? (Plusieurs réponses possibles)
 - a. *Hémophilus influenzae*
 - b. *Candida albicans*
 - c. *Chlamydia trachomatis*
 - d. *Gardnerella vaginalis*
 - e. Streptocoques A

2. Quelles affirmations concernant le lichen scléreux sont correctes ? (Plusieurs réponses possibles)
 - a. L'âge typique de manifestation chez l'enfant/l'adolescent est entre 4 et 7 ans
 - b. Les modifications de l'architecture/des cicatrices ne se produisent pas pendant l'enfance
 - c. Les enfants n'ont pas besoin de thérapie de maintien
 - d. Des contrôles réguliers sont recommandés jusqu'à au moins le début de la puberté
 - e. Le lichen scléreux disparaît à la puberté

3. Quelle est la cause la plus fréquente d'un SUA (saignement utérin anormal) chez les adolescentes ?
 - a. Infection
 - b. Ovariell (anovulation)
 - c. Trouble de la coagulation

4. Vous recevez en consultation à votre cabinet de pédiatrie une fillette de 7 ans qui présente un saignement vaginal en faible quantité depuis la veille, pour la deuxième fois avec un intervalle d'environ 1 mois entre les deux épisodes. L'anamnèse et le status sont sans particularité. Que faites-vous?
 - a. Vous suspectez une ménarche précoce et proposez de la revoir dans quelques semaines.
 - b. Vous demandez une évaluation au service de protection des enfants de votre région.
 - c. Vous prescrivez un bilan sanguin et une échographie pelvienne, et demandez un avis spécialisé.

On vous prie d'envoyer les réponses exactes avec votre nom a info@medicaltv.ch